


Estrategias de control de raigras resistente a glifosato.


► EVOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA RAIGRÁS RESISTENTE A GLIFOSATO.

Mapas REM Aapresid: Abundancia (% lotes afectados)

Lolium sp RG - 2017



Lolium sp RG - 2023



Situación de Barbecho químico largo en la postemergencia de raigras resistente a Glifosato.

Contundencia en el control postemergente y de futuras emergencias. Mezcla de diferentes modos de acción. Espectro de acción en otras malezas.

Dosis de uso: **Titus**[®] **Ligate**[®]
100 gr/ha **HERBICIDA** **HERBICIDA**

Titus[®] **Galant**[®] Max **Panzer**[®] Gold En
HERBICIDA **HERBICIDA** **HERBICIDA**
► Rotación a soja o maíz

Ligate[®] **Galant**[®] Max **Panzer**[®] Gold En
HERBICIDA **HERBICIDA** **HERBICIDA**
► Rotación a soja STS

► ENSAYO DEMOSTRATIVO EN VILLA SABOYA, BUENOS AIRES. (J. Jaime, 2020)

Titus[®] **Galant**[®] Max **Panzer**[®] Gold En
HERBICIDA **HERBICIDA** **HERBICIDA**

100 GR/HA + 130 CC/HA + 2 L/HA

60 días desde aplicación - Momento de aplicación en 2-4 macollos.



Ligate[®] **Galant**[®] Max **Panzer**[®] Gold En
HERBICIDA **HERBICIDA** **HERBICIDA**

100 GR/HA + 130 CC/HA + 2 L/HA

110 días desde aplicación - Momento de aplicación en 2-4 macollos.



► NO REALIZAR MEZCLAS DE GALANT[®] MAX CON 2,4-D O DICAMBA PARA EL CONTROL DE RAIGRAS Y MALEZAS DE HOJA ANCHA (ANTAGONISMO). EN ESAS SITUACIONES SE PUEDE MEZCLAR GALANT[®] MAX CON STARANE[®] XTRA, LONTREL[®], TORDON[®] 24K O ELEVORE[®].

Ing. Agr. Joaquín Jaime – Crop Protection Leader – joaquin.jaime@corveva.com